



+90 312 911 52 50
www.lemadis.com.tr

Yükseltepe, Menekşe Evleri, 1572. Cd. 83/D, 06220
Keçiören/Ankara

f @ lemadispoliklinik
BİZİ TAKİP EDİN



www.lemadis.com.tr

**PEDODONTİ
TEDAVİ**
SONRASI DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER



Çocuk Hastalarda İşlem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diş Çekimi işlemleri

Konulan tampon 30 dk boyunca ısırılmalı, 30 dk tamamlandıktan sonra çıkarılıp çöpe atılmalıdır.

Tampon çıkarıldıktan sonra sızıntı şeklinde kanama olması normaldir.

Çekim bölgesindeki pıhtılaşmayı bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır (Emmek, tükürmek.vb.).

Uyuşukluk hissi geçene kadar yemek yenilmemelidir (işlem sonrası yaklaşık 2 saat).

Sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalı, ılık olarak tüketilmelidir.

Çekim bölgesine kaçabilecek pirinç, bezelye gibi küçük taneli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

İlk günden sonra işlem bölgesi hafif bir şekilde fırçalanmalı, sonrasında gargara verildiyse kullanılmalıdır.



Kanal Tedavisi ve Dolgu İşlemleri Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dolgu işleminden sonra ilk hafta sızlama düzeyinde ağrı çok normaldir.

Kanal tedavisi işleminde ara seanslarda hafif derecede ağrı çok normaldir.

Dayanılmayacak düzeyde ağrısı varsa ve geçici dolgusu düştüyse doktorunuza başvurabilirsiniz.

DİKKAT!

Çocuklarda çekim sonrası, anestezinin etkisi geçene kadar yanak ve dudakların ısırılmamasına dikkat edilmelidir.

Erken yaşlarda daimi diş kaybı yaşamamak amacıyla 6 ayda 1 düzenli kontroller önerilmektedir.

